

BROCUM LIGHT BLOCCHI

Esca rodenticida pronta all'uso
in blocco paraffinato

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della salute n° IT/2018/00447/AUT

RODENTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 2 - Aprile 2025

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Brodifacoum	0,0025%
Denatonio benzoato	0,0010%
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b.	100 g

CARATTERISTICHE

Esca rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato contenente principio attivo anticoagulante da utilizzare esclusivamente da parte di utilizzatori professionali addestrati (trained professional).

La formulazione di BROCUM LIGHT BLOCCHI è studiata per il controllo di Ratti (*Rattus norvegicus*) e Topi (*Mus musculus*).

BROCUM LIGHT BLOCCHI è autorizzato per uso all'interno e attorno agli edifici (locali domestici, ristorazione, strutture sanitarie, industria alimentare, settore navale, logistica, hospitality, settore zootecnico), aree aperte (territori comunali), discariche e fogne secondo le indicazioni presenti in etichetta.

MODALITÀ D'IMPIEGO

INTERNO E ATTORNO EDIFICI

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Topi** (*Mus musculus*) posizionare 20-40 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 10-15 m tra loro e comunque non inferiore ai 5 m. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus*) posizionare 100-200 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 5-10 m tra loro e comunque non inferiore ai 5 m.

IN AREE APERTE

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Topi** (*Mus musculus*) posizionare 20-40 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 10-15 m tra loro e comunque non inferiore ai 5 m. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus*) posizionare 100-200 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 5-10 m tra loro e comunque non inferiore ai 5 m.

UTILIZZO NELLE FOGNE

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus*) posizionare 100-200 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 5-10 m tra loro.

UTILIZZO IN TANA

Quando il prodotto viene applicato direttamente nelle tane, coprire o bloccare l'ingresso dei punti trattati al fine di ridurre il rischio che le esche vengano trascinate fuori.


MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino al completo consumo.

I Prodotti non devono essere utilizzati oltre i 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non alternare l'uso di diversi anticoagulanti con potenza comparabile o più debole ai fini della gestione della resistenza.

Per l'uso alternato, prendere in considerazione l'uso di un rodenticida non anticoagulante, se disponibile, o di un anticoagulante più potente.



INFESTANTI TARGET

TOPI

Mus musculus

RATTI

Rattus norvegicus

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

EROGATORI D'ESCA

Ristorat

Serie Protecta

PK1847

Rodent Baiters Rat



PERICOLO

Indicazioni di Pericolo (H):

H373 - Può provocare danni agli organi (sangue)
in caso di esposizione prolungata o ripetuta



ALLERGENI:

Mais

Farina

Senape (tracce)



INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.