

FUMISPORE OPP

Disinfettante per la distruzione di muffe e batteri

PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICO.
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SANITÀ N.19238

DISINFETTANTI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Ottobre 2024

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Ortofenilfenolo	20 g
Eccipienti fumogeni q.b. a	100 g

CARATTERISTICHE

Fumispore OPP è un composto registrato al Ministero della Salute per il trattamento battericida e fungicida dei locali per lo stoccaggio e la preparazione di prodotti di origine animale e vegetale.

L'ortofenilfenolo consente un'efficace azione distruttiva nei confronti di muffe, lieviti e batteri presenti nell'aria e sulle superfici. Inoltre, i dati tossicologici indicano che il prodotto, utilizzato come indicato nelle istruzioni, non comporta alcun rischio per il personale.

APPLICAZIONE

Trattamento preventivo e di mantenimento:

- Dose: 0,4 g di prodotto /metro cubo.

Si consiglia il trattamento di mantenimento con cadenza settimanale.

Trattamento di primo attacco:

- Dose: 0,8 g di prodotto /metro cubo..

Il trattamento di primo attacco deve essere eseguito la prima volta che si usa Fumispore OPP e nelle zone in cui è stata appurata la presenza di una contaminazione ambientale da batteri, muffe o lieviti.

Trattamento saltuario:

In alcuni ambienti non è possibile effettuare un trattamento settimanale (ad esempio nei silos e nei magazzini di stoccaggio). In questi casi, ogni volta che il locale viene svuotato da prodotti alimentari occorre eseguire 2 trattamenti di primo attacco lasciando trascorrere un intervallo di 3 giorni tra il primo ed il secondo trattamento; attendere 1 giorno e proseguire con altri 2 trattamenti di mantenimento a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro.

QUALITÀ

Fumispore OPP è stato testato seguendo le norme AFNOR NF T 72-281, risultando efficace, alla dose di 0,8 g/m³ - (trattamento di primo attacco), nella distruzione dei seguenti microrganismi: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica ser. Enteritidis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Absidia corymbifera*, *Cladosporium cladosporioides*, *Aspergillus versicolor var. niger*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*, *Aspergillus fumigatus*, *Penicillium chrysogenum*, *Penicillium cyclopium*.



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):

- H315: Provoca irritazione cutanea.
- H319: Provoca grave irritazione oculare.
- H335: Può irritare le vie respiratorie.
- H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.