

GENERATION PAT

Esca rodenticida pronta all'uso
in pasta fresca in carta alimentare

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della salute n° IT/2013/00115/MRA

RODENTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 1 - Aprile 2022

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Difetialone	0,0025%
Denatonio benzoato	0,0010%
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b.	100 g

CARATTERISTICHE

Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca in carta alimentare da 20 g contenente principio attivo anticoagulante da utilizzare esclusivamente da parte di utilizzatori professionali addestrati (trained professional).

La formulazione di GENERATION PAT è studiata per il controllo di Ratti (*Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*) e Topi (*Mus musculus*).

GENERATION PAT è autorizzato per uso all'interno e attorno agli edifici (locali domestici, ristorazione, strutture sanitarie, industria alimentare, settore navale, logistica, hospitality, settore zootecnico), aree aperte (territori comunali), discariche e fogne secondo le indicazioni presenti in etichetta.

MODALITÀ D'IMPIEGO

INTERNO E ATTORNO EDIFICI

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Topi** (*Mus musculus*) posizionare fino a 50 g per punto di adescamento ad una distanza da circa 1,0-1,5 m per alta infestazione e ogni 2,0-3,0 m per bassa infestazione. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*) posizionare fino a 200 g per punto di adescamento ad una distanza da circa 4,0-5,0 m per alta infestazione e ogni 8,0-10,0 m per bassa infestazione.

IN AREE APERTE

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Topi** (*Mus musculus*) posizionare fino a 50 g per punto di adescamento ad una distanza da circa 1,0-1,5 m per alta infestazione e ogni 2,0-3,0 m per bassa infestazione. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*) posizionare fino a 200 g per punto di adescamento ad una distanza da circa 4,0-5,0 m per alta infestazione e ogni 8,0-10,0 m per bassa infestazione.

UTILIZZO NELLE FOGNE

Prodotto da non utilizzare direttamente nelle fogne.

UTILIZZO IN TANA

Prodotto da non utilizzare direttamente nelle tane.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino al completo consumo

I Prodotti non devono essere utilizzati oltre i 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non alternare l'uso di diversi anticoagulanti con potenza comparabile o più debole ai fini della gestione della resistenza.

Per l'uso alternato, prendere in considerazione l'uso di un rodenticida non anticoagulante, se disponibile, o di un anticoagulante più potente.



INFESTANTI TARGET

TOPI

Mus musculus

RATTI

Rattus norvegicus

Rattus rattus

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

EROGATORI D'ESCA

Ristorat

Serie Protecta

PK1847

Rodent Baiters Rat



PERICOLO

Indicazioni di Pericolo (H):

H373 - Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata



ALLERGENI:

Cereali (glutine)

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.