

IMIDASECT FORMICHE

Esca in gel

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA (PT18):
n° IT/2018/00459/MRS

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Gennaio 2022

COMPOSIZIONE

Imidacloprid (CAS 138261 41 3)	0,01 %
Coformulanti q.b.a	100 g

CARATTERISTICHE

Imidasect gel formiche è efficace nelle fasi di sviluppo di uova, larve, ninfe, pupe e adulti di formica radunasemi (*Monomorium pharaonis*) e formica argentina (*Linepithema humile*).

Il principio attivo imidacloprid, agisce legandosi ai neuroni degli insetti.

Questo legame provoca un disturbo nella trasmissione degli impulsi nervosi, che è letale per l'insetto bersaglio. Le formiche sono attratte dagli ingredienti nutrizionali dell'esca. Diffondo il gel spostandosi e contaminando i loro coetanei, causando l'avvelenamento (per contatto e ingestione) indipendentemente dalla fase di sviluppo (larve, novellame, individui adulti).

DESTINAZIONE D'USO

Non contaminare alimenti, mangimi, utensili o superfici a contatto con alimenti. Imidasect gel formiche può essere utilizzato in area interna lungo i percorsi delle formiche; Imidasect gel formiche può essere utilizzato in area esterna lungo il passaggio delle formiche per trattamento perimetrico; Imidasect gel formiche non va applicato su superfici assorbenti, lontano da fonti solari dirette o di calore.

Imidasect gel formiche può essere usato continuativamente per 2-3 mesi con massimo 12 applicazioni all'anno.

DOSI D'IMPIEGO

Uso per ambienti interni

- 1/2 gocce di gel per /m²

Uso per ambienti esterni

- 1 goccia di gel direttamente all'entrata del formicaio o 1 goccia/m lungo il passaggio delle formiche per trattamento perimetrico.

Applicare le gocce di gel aventi un diametro di circa 1 cm (approssimativamente 0.2 g). Il prodotto può essere usato di continuo per 2/3 mesi senza sostituire le trappole aperte o le esche non consumate.

Massimo 12 applicazioni l'anno.



INFESTANTI TARGET

INSETTI

Formiche (*Monomorium pharaonis* e *Linepithema humile*).

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

Bait gun classic
Multi dose bait gun
Stantuffi per siringhe



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.