

RATOMIDE BLOX

Esca rodenticida pronta all'uso
in blocco paraffinato

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della salute n° IT/2018/00447/AUT

RODENTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 1 - Gennaio 2024

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Brodifacoum	0,0025%
Denatonio benzoato	0,0010%
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b.	100 g

CARATTERISTICHE

RATOMIDE BLOCKS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

RATOMIDE BLOCKS contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

RATOMIDE BLOCKS è un'esca pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

RATOMIDE BLOCKS grazie al basso dosaggio di principio attivo (25ppm), garantendo l'efficacia necessaria risulta maggiormente appetibile ai roditori, e assume una classificazione più favorevole rispetto ai rodenticidi tradizionali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Interno agli edifici

Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), posizionare 20-40 g di **RATOMIDE BLOCKS** per contenitore, pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno, ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro. Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), posizionare 100-200 g di **RATOMIDE BLOCKS** per contenitore, pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno, ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro.

Esterno e Interno agli edifici

Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), posizionare 20-40 g di **RATOMIDE BLOCKS** per contenitore, pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno, ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro. Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), posizionare 100-200 g di **RATOMIDE BLOCKS** per contenitore, pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno, ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro.


MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino al completo consumo

I Prodotti non devono essere utilizzati oltre i 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non alternare l'uso di diversi anticoagulanti con potenza comparabile o più debole ai fini della gestione della resistenza.

Per l'uso alternato, prendere in considerazione l'uso di un rodenticida non anticoagulante, se disponibile, o di un anticoagulante più potente.



INFESTANTI TARGET

TOPI

Mus musculus

RATTI

Rattus norvegicus

ATTREZZATURE CONSIGLiate

EROGATORI D'ESCA

Ristorat

Serie Protecta

PK1847

Rodent Baiters Rat



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):

H373 - Può provocare danni agli organi (sangue)
in caso di esposizione prolungata o ripetuta



ALLERGENI:

Mais

Frumento

Senape (tracce)

Soia (tracce)

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.