

RATOMIDE PASTA

Esca rodenticida pronta all'uso
in pasta fresca in carta alimentare

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Autorizzazione del Ministero della salute n° IT/2018/00446/AUT

RODENTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 1 - Gennaio 2024

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Brodifacoum	0,0025%
Denatonio benzoato	0,0010%
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b.	100 g

CARATTERISTICHE

RATOMIDE PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. **RATOMIDE PASTA** contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

RATOMIDE PASTA è un'esca pronta all'uso in forma di pasta, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

RATOMIDE PASTA, grazie al basso dosaggio di principio attivo (25ppm), garantendo l'efficacia necessaria risulta maggiormente appetibile ai roditori, e assume una classificazione più favorevole rispetto ai rodenticidi tradizionali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

RATOMIDE PASTA è un'esca pronta all'uso in pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Interno, esterno e attorno edifici

Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), posizionare 20-40 g di **RATOMIDE PASTA** per contenitore, pari a 1-2 esche in pasta fresca pronti all'uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro. Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), posizionare 100-200 g di **RATOMIDE PASTA** per contenitore, pari a 5-10 esche in pasta fresca pronti all'uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino al completo consumo.

I Prodotti non devono essere utilizzati oltre i 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non alternare l'uso di diversi anticoagulanti con potenza comparabile o più debole ai fini della gestione della resistenza.

Per l'uso alternato, prendere in considerazione l'uso di un rodenticida non anticoagulante, se disponibile, o di un anticoagulante più potente.



INFESTANTI TARGET

TOPI
Mus musculus

RATTI
Rattus norvegicus

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

EROGATORI D'ESCA

Ristorat
Serie Protecta
PK1847
Rodent Baiters Rat



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):

H373 - Può provocare danni agli organi (sangue)
in caso di esposizione prolungata o ripetuta



ALLERGENI:

Mais
Frumento
Senape (tracce)
Sola (tracce)

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.