

# RODIFEN LIQUIDO

## Esca rodenticida liquida pronta all'uso

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Autorizzazione del Ministero della salute n° IT/2017/00372/AUT

RODENTICIDI



Scheda  
Tecnica

Revisione 0 - Gennaio 2022

### COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Difenacoum	0,0026%
Denatonio benzoato	0,0010%
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b.	100 g

### CARATTERISTICHE

Esca rodenticida liquida pronta all'uso contenente principio attivo anticoagulante da utilizzare esclusivamente da parte di utilizzatori professionali addestrati (trained professional).

La formulazione di RODIFEN LIQUIDO è studiata per il controllo di Ratti (*Rattus norvegicus*) e Topi (*Mus musculus*).

RODIFEN LIQUIDO è autorizzato per uso all'interno e attorno agli edifici (*locali domestici, ristorazione, strutture sanitarie, industria alimentare, settore navale, logistica, hospitality, settore zootecnico*), aree aperte (*territori comunali*), discariche e fogne secondo le indicazioni presenti in etichetta.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

#### INTERNO E ATTORNO EDIFICI

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Topi** (*Mus musculus*) posizionare un massimo di 100 ml di prodotto per punto di adescamento ogni 2,0-5,0 m. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus*) posizionare un massimo di 250 ml di prodotto per punto di adescamento ogni 5,0-10,0 m.

#### IN AREE APERTE E DISCARICHE

Da ancorare all'interno degli appositi erogatori d'esca. Per **Topi** (*Mus musculus*) posizionare un massimo di 100 ml di prodotto per punto di adescamento ogni 2,0-5,0 m. Per **Ratti** (*Rattus norvegicus*) posizionare un massimo di 250 ml di prodotto per punto di adescamento ogni 5,0-10,0 m.

#### UTILIZZO NELLE FOGNE

Da non utilizzare in fognatura.

#### UTILIZZO IN TANA

Da non utilizzare in tana.

### MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino al completo consumo

I Prodotti non devono essere utilizzati oltre i 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non alternare l'uso di diversi anticoagulanti con potenza comparabile o più debole ai fini della gestione della resistenza.

Per l'uso alternato, prendere in considerazione l'uso di un rodenticida non anticoagulante, se disponibile, o di un anticoagulante più potente.



### INFESTANTI TARGET

**TOPI**  
*Mus musculus*

**RATTI**  
*Rattus norvegicus*

### ATTREZZATURE CONSIGLIATE

**EROGATORI D'ESCA**  
Ristorat  
Serie Protecta  
PK1847  
Rodent Baiters Rat



PERICOLO

#### Indicazioni di Pericolo (H):

H373 - Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta

### INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.